



CONSISTENTE Y PODEROSO ALIVIO PARA LAS ALERGIAS DE SUS HIJOS(AS)*

ZYRTEC® Jarabe Antialérgico para Niños*†



Use los productos solo como se indica.

Edad	Dosis
Adultos y niños de 6 años en adelante	5 ml o 10 ml una vez al día, según la gravedad de los síntomas. No tome más de 10 ml en 24 horas.
Niños de 2 años hasta menos de 6 años	2.5 ml una vez al día. Si es necesario, la dosis se puede aumentar hasta un máximo de 5 ml una vez al día, o 2.5 ml cada 12 horas. No administre más de 5 ml en 24 horas.
Niños menores de 2 años	Consulte con un médico.
Consumidores con enfermedad hepática o renal	Consulte con un médico.
Adultos de 65 años o más	5 ml una vez al día. No tome más de 5 ml en 24 horas.

ZYRTEC® Tabletas Masticables para Niños*



Use los productos solo como se indica.

Edad	Dosis:	
	TABLETAS MASTICABLES DE 2.5 MG	TABLETAS MASTICABLES DE 10 MG
Niños de 2 años hasta menos de 6 años	Mastique y trague 1 tableta (2.5 mg) una vez al día; si es necesario, la dosis se puede aumentar a un máximo de 2 tabletas (5 mg) una vez al día o 1 tableta (2.5 mg) cada 12 horas. No administre más de 2 tabletas (5 mg) en 24 horas.	Consulte con un médico.
Adultos y niños de 6 años en adelante	Mastique y trague 2 tabletas (5 mg) o 4 tabletas (10 mg) una vez al día, dependiendo de la gravedad de los síntomas; no tome más de 4 tabletas (10 mg) en 24 horas.	Mastique y trague 1 tableta (10 mg) una vez al día; no tome más de 1 tableta (10 mg) en 24 horas. Un producto de 5 mg puede ser apropiado para síntomas menos graves.
Niños menores de 2 años	Consulte con un médico.	Consulte con un médico.
Consumidores con enfermedad hepática o renal	Consulte con un médico.	Consulte con un médico.
Adultos de 65 años o más	Mastique y trague 2 tabletas (5 mg) una vez al día; no tome más de 2 tabletas (5 mg) en 24 horas.	Consulte con un médico.

ZYRTEC® Tabletas Solubles para Niños*



Use el producto solo como se indica.

Edad	Dosis
Adultos y niños de 6 años en adelante	Una tableta de 10 mg una vez al día; no tome más de una tableta de 10 mg en 24 horas. Un producto de 5 mg puede ser apropiado para síntomas menos graves.
Niños menores de 6 años	Consulte con un médico.
Consumidores con enfermedad hepática o renal	Consulte con un médico.
Adultos de 65 años o más	Consulte con un médico.

Si necesita información adicional sobre el manejo de las alergias, hable con su pediatra. Vea el otro lado para obtener información sobre la dosificación de BENADRYL® para Niños

ml = mililitro.

*Alivia estornudos, goteo nasal, ojos acuosos e irritados y picazón de nariz y garganta. †Úselo solo con el vaso dosificador provisto con el producto.



LA MARCA A LA QUE LAS MADRES RECURREN PRIMERO*



*Cuando tratan por primera vez las alergias respiratorias superiores de sus hijos.


EDAD	DOSIS
6 a 11 años	Tome de 5 ml a 10 ml cada 4 a 6 horas o según las indicaciones de un médico. No tome más de 6 dosis en 24 horas.
2 a 5 años	No lo use a menos que lo indique un médico.
Menores de 2 años	No usar.



BENADRYL®
Jarabe Antialérgico
para Niños†‡

Use los productos solo como se indica.

EDAD	DOSIS
12 años o más	Tome 10 ml cada 4 horas. No tome más de 6 dosis en 24 horas.
6 a 11 años	Tome 5 ml cada 4 horas. No tome más de 6 dosis en 24 horas.
4 a 5 años	No lo use a menos que lo indique un médico.
Menores de 4 años	No usar.



BENADRYL®
Allergy Plus Congestion
para Niños†‡

Use el producto solo como se indica.

EDAD	DOSIS
12 años o más	2 a 4 tabletas masticables (25 mg a 50 mg) cada 4 a 6 horas, o según las indicaciones del médico. No tome más de 6 dosis en 24 horas.
6 a 11 años	1 a 2 tabletas masticables (12.5 mg a 25 mg) cada 4 a 6 horas, o según las indicaciones del médico. No tome más de 6 dosis en 24 horas.
2 a 5 años	No lo use a menos que lo indique un médico.
Menores de 2 años	No usar.



BENADRYL®
Tabletas Masticables
para Niños†

Use el producto solo como se indica.

**Vea el otro lado para obtener información
sobre la dosificación de ZYRTEC® para Niños**

**Si necesita información adicional sobre el
manejo de las alergias, hable con su pediatra.**

ml = mililitro.

†Alivia estornudos, goteo nasal, ojos acuosos e irritados y picazón de nariz y garganta.

‡Úselo solo con el vaso dosificador provisto con el producto.